

現在敗血症の 治療を受けている方へ

敗血症は、感染症に対する体の反応によって、自身の健康な組織や臓器が傷ついてしまう状態です。現在の感染症が、敗血症を引き起こしている可能性があります。敗血症は医療上の緊急事態であり、速やかな医療処置が必要です。

敗血症はどのように治療されますか？

敗血症の治療は病院で行われ、早期に開始するほど効果が期待できます。敗血症の患者の中には、集中治療室 (ICU) での治療が必要になる人もいます。

治療では抗菌薬 (抗生物質) が使用されます。必要に応じて、次のような治療も行われます。

- その他の薬剤による治療
- 点滴による水分補給
- 呼吸補助
- 手術

回復と退院

退院前に、医療チームから次の事項について説明があります。

- 回復状況や、回復までにかかる期間
- 感染症を予防する方法
- 症状が改善しない、または悪化した場合に現れる兆候
- 薬の安全な服用方法
- 長期的な影響や、今後必要となるケア

一度敗血症にかかると、再び敗血症になる可能性が高くなります。退院後に症状が悪化している場合や、症状の悪化が心配な場合は、**13Health** に電話して助言を受けるか、かかりつけ医 (GP) を受診するか、病院を再度受診してください。

長期的な影響

敗血症からの回復には時間がかかり、長期的な影響が残る場合もあります。しばらく体調が優れない状態が続いたり、日常生活に戻ることが難しくなったりすることがあります。心配なことや不安がある場合は、医師または医療チームに相談してください。

また、しばらくの間、免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなることがあります。予防接種を適切に受け、衛生管理を心がけるとともに、回復に役立つ治療について医療チームに相談してください。

敗血症の治療中および治療後の支援

通訳や文化連絡担当者 (Cultural Liaison Officer) の支援が必要な場合は、医療チームにお知らせください。

下記のQRコードを読み取るか、「Sepsis Australia」で検索すると、回復中の患者さんやご家族を支援する敗血症サポートグループに関する情報をご覧ください。



このファクトシートに関するご意見・ご感想は、QRコードからお寄せください。



敗血症に関する詳しい情報やサポートについては、QRコードを読み取ってください。