



Patient Information Sheet (Simplified Chinese)病人信息表

MRI Contrast MRI 造影剂

1. 什么是 MRI 造影剂?

医生要求您做的医疗影像检查可能会用到 MRI 造影剂。MRI 造影剂是一种无色液体，它通过注射进入您的血液。MRI 造影剂不是染色剂，不会造成体内染色。在 MRI 医疗成像过程中使用造影剂可以使您的器官看得更清晰。您的医生需要用 MRI 造影剂来获得全部信息以帮助诊断。

本信息表必须与您所预约检查的信息表一起阅读（如果您没有此信息表，请向工作人员索取）。

2. 在检查过程中

MRI 造影剂注入时，您应该没有任何异常的感觉。

3. 检查后

MRI 造影剂不会影响您从事正常活动的 ability。您应该可以正常进行日常活动。

4. 注意事项

造影剂不适合某些人。在使用造影剂前，将会问您一系列问题。您的答案可以帮助医护人员确定您是否有任何危险。

- 如果您怀孕或怀疑可能怀孕，或正在母乳喂养，请告诉医护人员。

肾脏功能

- 造影剂由肾脏通过尿液从血液中排除。对于肾脏功能正常的人，它很容易从体内排除。
- 对于肾功能较弱（即“肾衰竭”）的人，将无法把 MRI 造影剂排出体外。这可能会导致非常罕见的功能失调，即肾源性系统纤维化（NSF）
- 肾源性系统纤维化是一种导致全身皮肤和组织结疤和增厚的疾病。结疤会导致肌肉、筋腱、韧带或皮肤变紧，阻碍正常活动和功能。这是一种严重的致残病况，而且可能导致死亡。
- 可能会要求您做一个简单的血液测试，以确定您的肾功能。

5. MRI 造影剂有哪些危险?

与 MRI 造影剂有关的危险和并发症包括但不限于以下几项。

常见危险和并发症包括：

- 无已知常见危险。

较不常见的危险和并发症包括：

- 注入的造影剂可能会渗到血管外面，流入皮下或进入组织。这可能需要治疗。在非常罕见的情况下，如果出现皮肤破裂，可能需要进一步的手术治疗。

- 可能会因为医疗和/或技术的原因而无法进行注射。

罕见的危险和并发症包括：

- 过敏反应会在头一小时内出现，大部分是发生在头 5 分钟内。

反应种类有：

轻微—头痛、短时恶心、头晕、荨麻疹、红疹和瘙痒。

中度—大面积荨麻疹、头痛、面部肿胀、呕吐、呼吸短促。

严重—严重反应比较罕见，但是包括：有生命危险的心悸、血压非常低、喉咙肿胀、痉挛和/或心脏停搏。

- 肾源性系统纤维化只见于肾功能严重损坏的病人。
- MRI 造影剂导致的死亡非常罕见。

6. 出院后有哪些安全问题?

如果您感到不舒服，请到最近的事后和急诊部门或看全科医生。

需要告诉医生/医护人员的事情：

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Queensland
Government**

PATIENT INFORMATION SHEET ONLY

NO DOCUMENTED CONSENT REQUIRED

Unless patient is renal impaired

If a documented consent is required
Interpreter Services *must* be accessed