

### 1. 什麼是 MRI 造影劑?

醫生要求您做的醫療影像檢查可能會用到 MRI 造影劑。MRI 造影劑是一種無色液體，它通過注射進入您的血液。MRI 造影劑不是染色劑，不會造成體內染色。在 MRI 醫療成像過程中使用造影劑可以使您的器官看得更清晰。您的醫生需要用 MRI 造影劑來獲得全部資訊以幫助診斷。

**本資訊表必須與您所預約檢查的資訊表一起閱讀（如果您沒有此資訊表，請向工作人員索取）。**

### 2. 在檢查過程中

MRI 造影劑注入時，您應該沒有任何異常的感覺。

### 3. 檢查後

MRI 造影劑不會影響您從事正常活動的能力。您應該可以正常進行日常活動。

### 4. 注意事項

造影劑不適合某些人。在使用造影劑前，將會問您一系列問題。您的答案可以幫助醫護人員確定您是否有任何危險。

- 如果您懷孕或懷疑可能懷孕，或正在母乳餵養，請告訴醫護人員。

#### 腎臟功能

- 造影劑由腎臟通過尿液從血液中排除。對於腎臟功能正常的人，它很容易從體內排除。
- 對於腎功能較弱（即“腎衰竭”）的人，將無法把 MRI 造影劑排出體外。這可能會導致非常罕見的功能失調，即腎源性系統纖維化（NSF）
- 腎源性系統纖維化是一種導致全身皮膚和組織結疤和增厚的疾病。結疤會導致肌肉、筋腱、韌帶或皮膚變緊，阻礙正常活動和功能。這是一種嚴重的致殘病況，而且可能導致死亡。
- 可能會要求您做一個簡單的血液測試，以確定您的腎功能。

### 5. MRI 造影劑有哪些危險?

與 MRI 造影劑有關的危險和併發癥包括但不限於以下幾項。

#### 常見危險和併發癥包括:

- 無已知常見危險。

#### 較不常見的危險和併發癥包括:

- 注入的造影劑可能會滲到血管外面，流入皮下或進入組織。這可能需要治療。在非常罕見的情況下，如果出現皮膚破裂，可能需要進一步的手術治療。
- 可能會因為醫療和/或技術的原因而無法進行注射。

#### 罕見的危險和併發癥包括:

- 過敏反應會在頭一小時內出現，大部分是發生在頭 5 分鐘內。

#### 反應種類有:

*輕微*—頭痛、短時噁心、頭暈、蕁麻疹、紅疹和瘙癢。

*中度*—大面積蕁麻疹、頭痛、面部腫脹、嘔吐、呼吸短促。

*嚴重*—嚴重反應比較罕見，但是包括：有生命危險的心悸、血壓非常低、喉嚨腫脹、痙攣和/或心臟停搏。

- 腎源性系統纖維化只見於腎功能嚴重損壞的病人。
- MRI 造影劑導致的死亡非常罕見。

### 6. 出院後有哪些安全問題?

如果您感到不舒服，請到最近的事故和急診部門或看全科醫生。

#### 需要告訴醫生/醫護人員的事情:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Queensland  
Government**

**PATIENT INFORMATION SHEET ONLY**

**NO DOCUMENTED CONSENT REQUIRED**

*Unless patient is renal impaired*

If a documented consent is required  
Interpreter Services *must* be accessed