

## نشرة المعلومات الصحية للمريض - Patient Information Sheet (Arabic) - التصوير بالأشعة أثناء البلع أو تناول وجبة - Swallow / Meal under Imaging

ملاحظات أناقشها مع طبيبي/الممارس الصحي:

1. ما هو التصوير بالأشعة أثناء البلع أو تناول وجبة؟

التصوير الإشعاعي أثناء البلع أو أثناء تناول وجبة هو استخدام الأشعة السينية (x-ray) لتصوير المريء والمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. إذ تؤخذ سلسلة من صور الأشعة السينية أثناء قيامك ببلع مادة ظليلة، كانت تعرف في السابق بصبغة الأشعة السينية. وفي بعض الأحيان تغطي قطع الطعام بالمادة الظليلة ويطلب منك ابتلاعها أثناء التقاط صور الأشعة السينية لك. دراسة عملية البلع المعنلة أو فيديو لعملية البلع هو إجراء مشابه للتصوير بالأشعة السينية يدرس كيفية قيامك بعملية البلع.

2. هل سأشعر بالانزعاج؟ وهل هناك ضرورة للمخدر؟

إن التصوير بالأشعة السينية أثناء البلع أو تناول وجبة ليس بالإجراء المؤلم ولا يحتاج إلى تخدير.

3. التحضير للإجراء

سيقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات الواجب اتباعها للتحضير لهذا الإجراء.  
▪ يرجى إعلام الموظف إذا كنت حاملاً أو تشكّين في وجود حمل.

4. أثناء الإجراء

سيطلب منك بلع المادة الظليلة أو قطع الطعام أثناء التقاط صور الأشعة السينية. قد يطلب منك بلع سائل أو مسحوق أو قرص يفرز غازاً في معدتك. قد تشعر ذلك بالامتلاء وسيتمكن طبيبك من فحص معدتك.

5. بعد الإجراء

قد يبدو برازك أبيض اللون لبضعة أيام بعد الإجراء، وهذا طبيعي. من المهم أن تشرب الكثير من الماء لبضعة أيام بعد الفحص لتجنب حدوث إمساك وتجفاف.

6. ما هي مخاطر هذا الإجراء النوعي؟

قد تشمل المخاطر والمضاعفات المصاحبة لهذا الإجراء ما يلي، ولكنها لا تقتصر على ذلك.

تشمل المخاطر والمضاعفات الشائعة:

- التقيؤ ويتطلب ذلك علاجاً بالأدوية.
- الإمساك - قد يساعد تناول الكثير من السوائل والمُليّنات في تخفيفه.
- الإسهال، مما يتسبب في التجفاف - وقد يساعد تناول الكثير من السوائل في تخفيفه.

تشمل المخاطر والمضاعفات الأقل شيوعاً:

- قد تُصاب بالتهاب رئوي إذا تسرب سائل من المعدة إلى الرئتين. قد يتطلب ذلك مضاداً حيويًا وعلاجاً إضافيًا.
- قد يكون الفحص غير ممكن نتيجة لأسباب طبية و/أو فنية.

تشمل المخاطر والمضاعفات النادرة:

- زيادة خطر الإصابة بالسرطان نتيجة التعرض للأشعة السينية.
- رد فعل أرجي (حساسية) للمادة الظليلة. قد ينتج عنه طفح جلدي، أو شرى، أو حكة، أو شعور بالغثيان، أو إغماء أو انقطاع النفس. قد تُعطى أدوية للتخفيف من ذلك.
- الوفاة نتيجة لهذا الإجراء أمر نادر جداً.

7. ما هي إجراءات السلامة عند مغادرتك للمستشفى؟

توجه إلى أقرب قسم للحوادث والطوارئ أو إلى الطبيب العام إذا شعرت بالتوعل.



**Queensland  
Government**

**PATIENT INFORMATION SHEET ONLY**

**NO DOCUMENTED CONSENT REQUIRED**

*Unless patient is renal impaired*

If a documented consent is required  
Interpreter Services *must* be accessed