



Patient Information Sheet (Vietnamese) Tờ Chỉ Dẫn cho Bệnh Nhân Iodinated Contrast Thuốc Chẩn Quang Tuyến có Chất I-ốt

1. Thuốc chẩn quang tuyến có I-ốt là gì?

Thủ tục chụp hình y học mà bác sĩ của quý vị đã yêu cầu quý vị làm có dùng 'Thuốc Chẩn Quang Tuyến' có chất I-ốt (đã có thời được gọi là thuốc nhuộm quang tuyến X). Thuốc chẩn quang tuyến là một chất lỏng không có màu, trong có chất I-ốt. Thuốc chẩn quang tuyến được chích vào mạch máu của quý vị để thấy được rõ hơn các bộ phận trong cơ thể của quý vị trên hình chụp quang tuyến X. Thuốc chẩn quang tuyến không phải là một chất nhuộm. Nó không để lại một màu nào trong cơ thể của quý vị. Bác sĩ của quý vị cần thuốc chẩn quang tuyến để có thể có những chi tiết cần thiết để định bệnh cho quý vị.

Tờ chỉ dẫn này phải được đọc cùng với tờ chỉ dẫn của thủ tục mà quý vị đã đặt hẹn làm (nếu chưa có tờ chỉ dẫn này xin quý vị hỏi để lấy một tờ).

2. Trong khi làm thủ tục

Khi thuốc chẩn quang tuyến được chích vào người quý vị có thể cảm thấy:

- Một cảm giác ấm hay 'đỏ mặt' tràn khắp thân thể quý vị, việc này cũng có thể làm quý vị cứ tưởng như là mình mới tiểu tiện. Quý vị sẽ *không* tiểu tiện – đó chỉ là một cảm giác mà thôi.
- Một cảm giác có mùi hay vị 'kim loại' cũng có thể xảy đến. Cảm giác này chỉ kéo dài dưới một phút.

3. Sau thủ tục

Chúng tôi đề nghị quý vị uống từ 2 tới 4 ly nước sau khi làm xong thủ tục này để giúp thải thuốc chẩn quang tuyến ra khỏi cơ thể của quý vị.

Thuốc chẩn quang tuyến không có ảnh hưởng gì tới khả năng làm việc thông thường của quý vị; quý vị nên tiếp tục với cuộc sống hàng ngày của mình như thường lệ.

4. Thận trọng

Thuốc chẩn quang tuyến không thích hợp với một số người; quý vị sẽ phải trả lời một số câu hỏi trước khi được chích thuốc này. Những câu trả lời của quý vị sẽ ấn định những rủi ro mà quý vị có thể gặp.

- Xin quý vị cho nhân viên biết quý vị đang có bầu hay nghi là có bầu hay đang cho con bú.

Chức năng của thận

- Thuốc chẩn quang tuyến được thận thải ra khỏi cơ thể của quý vị qua nước tiểu. Nó được thải ra một cách dễ dàng khỏi cơ thể của những người có thận làm việc bình thường.
- Chích thuốc chẩn quang tuyến cho những người có thận yếu (suy thận), có thể làm cho thận bị hư hại thêm, mà vì thế có thể làm cho thận ngưng hoạt động bình thường (suy thận cấp tính).
- Quý vị có thể xin làm một cuộc thử máu đơn giản để tìm biết mức hoạt động của thận của mình.

Phản ứng của thuốc tiểu đường – Metformin

(Các tên thuốc khác: Avandamet, Diabex, Diaformin, Formet, Glucohexal, Glucomet, Glucophage, Glucovance, Metforbell).

Nếu thận bị thuốc chẩn quang tuyến làm hại thì thận có

thể sẽ không thải được thuốc Metformin ra khỏi cơ thể. Khi dùng thuốc chẩn quang tuyến nên tạm ngưng dùng thuốc Metformin trong một thời gian ngắn thì sẽ được an toàn hơn. Các nhân viên sẽ cho quý vị rõ khi nào ngưng và khi nào dùng trở lại thuốc Metformin.

Quý vị phải gặp bác sĩ của mình, để theo dõi bệnh tiểu đường của mình, nếu quý vị bị bắt buộc phải ngưng dùng thuốc Metformin.

5. Có những gì nguy hiểm với thuốc chẩn quang tuyến có chất I-ốt?

Những rủi ro và biến chứng trong việc chích thuốc này có thể gồm có, nhưng không chỉ giới hạn vào những điều ghi dưới đây.

Những rủi ro và biến chứng thông thường gồm có:

- Được biết không có những rủi ro thông thường.

Những rủi ro và biến chứng kém thông thường hơn gồm có:

- Thuốc chẩn quang tuyến có thể rỉ ra ngoài mạch máu, ở dưới da và vào các mô. Việc này cần phải chữa. Trong các trường hợp rất hiếm, cần phải giải phẫu nếu da bị lở.
- Suy thận cấp tính có thể xảy ra khi một hay cả hai thận tự nhiên ngưng làm việc. Sự hư hại này có thể kéo dài trong nhiều ngày hay nhiều tuần lễ. Thận có thể phải cần tới một khoảng thời gian khá lâu trước khi bắt đầu làm việc trở lại như trước, và quý vị có thể cần phải chạy thận nhân tạo để lọc máu trong thời gian này. Cũng có nguy cơ là thận của quý vị sẽ bị hư hỏng vĩnh viễn. Để giảm bớt nguy cơ này chỉ có một lượng rất nhỏ chất chẩn quang tuyến được dùng để chích.
- Việc chích thuốc không thể thực hiện được vì những lý do y tế hay/và kỹ thuật.

Những rủi ro và biến chứng ít xảy ra gồm có:

- Dị ứng với thuốc chẩn quang tuyến xảy ra trong vòng một tiếng đồng hồ đầu, với hầu hết những dị ứng xảy ra trong 5 phút đầu. Phản ứng chậm được biết đã xảy ra tới một tuần lễ sau khi chích.

Ghi chú: Dị ứng với chất I-ốt và/hay đồ ăn biển không có nghĩa là sẽ có dị ứng với thuốc chẩn quang tuyến có I-ốt.

Những phản ứng thay đổi từ:

Nhẹ – nổi mề đay, đỏ mồm, hắt mũi, ho, buồn nôn.

Trung bình – mề đay lan rộng, nhức đầu, sưng mặt, nôn mửa, khó thở.

Nặng – Những phản ứng nặng rất ít khi xảy ra nhưng có thể gồm có: tim đập nhanh tới độ đe dọa tính mệnh, áp suất máu xuống rất thấp, sưng cuống họng, động kinh và/hay đứng tim.

- Tử vong vì thuốc chẩn quang tuyến có I-ốt *rất* hiếm khi xảy ra.

6. Có những vấn đề an toàn gì không khi quý vị rời nhà thương?

Tới khu Tai Nạn và Khẩn Cấp (Accident & Emergency hay A&E) hay một bác sĩ toàn khoa gần nhất nếu quý vị cảm thấy không được khoẻ.



**Queensland
Government**

PATIENT INFORMATION SHEET ONLY

NO DOCUMENTED CONSENT REQUIRED

Unless patient is renal impaired

If a documented consent is required
Interpreter Services *must* be accessed