



# Patient Information Sheet (Traditional Chinese) 病人資訊單

## Contrast Enema 對比灌腸

### 1. 什麼是對比灌腸？

對比灌腸是一種 X 光檢查，用鋇和腸道造影劑（Gastrografin®）之類的造影劑（以前叫做 X 光檢查染料）來檢查大腸（結腸）。

### 2. 會感覺不舒服嗎？需要麻醉嗎？

當肛管插入直腸以及氣囊膨脹時，您可能會感到不舒服。在這個過程中可能有鼓脹的感覺和輕微的腹部絞痛，這是正常的。有時候會使用讓肌肉鬆弛的藥物來緩解絞痛帶來的不適。

這項檢查不需要麻醉。

### 3. 準備檢查

醫療影像部會告訴您如何準備檢查。

- 會給您一個大腸檢查準備資料包。腸道必須完全排清，以使檢查準確、徹底。
- 如果您懷孕或懷疑可能懷孕，請告訴醫護人員。

### 4. 在檢查過程中

塗有潤滑劑的小肛管將會輕輕插入直腸內一小段。肛管底部的小氣囊將鼓起以幫助固定肛管並防止造影劑漏出。

造影劑將緩慢通過肛管注入大腸。有時會通過肛管向大腸加氣。然後拍攝 X 光照片。

通過肛管將造影劑從大腸排出（儘可能排盡）。

肛管從直腸取出。

### 5. 檢查後

檢查結束後，您可以去上廁所。您的大便在今後幾天可能會呈白色的，這是正常的。

檢查結束後的幾天內，要大量喝水，這是很重要的，以避免便秘和脫水。

### 6. 這個檢查有什麼危險？

與檢查有關的危險和併發癥包括但不限於以下幾項。

#### 常見危險和併發癥包括：

- 便秘。飲用大量液體及服用通便劑會有所幫助。
- 腹瀉。會造成脫水，飲用大量液體會有所幫助。

#### 較不常見的危險和併發癥包括：

- 可能會因為醫療和/或技術原因而無法進行檢查。

#### 罕見危險和併發癥包括：

- 因為暴露在 X 光下而增加患癌癥的危險。
- 腸穿孔。這可能需要抗生素和手術。
- 腸出血。這可能需要其他醫療和/或矯正手術。
- 菌血癥（血液感染）。這需要抗生素。

- 對造影劑有過敏反應。這可能會導致皮疹、蕁麻疹、發癢、噁心、昏厥或者呼吸短促。可用藥物緩解。
- 由於檢查而導致死亡是 *非常* 罕見的。

### 7. 離開醫院後有哪些安全問題？

如果感覺不舒服或有以下情況，請到最近的事務和急診部門或看全科醫生：

- 排便或排尿問題。
- 腹部壓痛和/或腹硬。
- 嚴重持續性腹痛。
- 直腸出血（血液超過半杯）
- 發燒

### 需要告訴醫生/醫護人員的事情：

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Queensland  
Government**

**PATIENT INFORMATION SHEET ONLY**

**NO DOCUMENTED CONSENT REQUIRED**

*Unless patient is renal impaired*

If a documented consent is required  
Interpreter Services *must* be accessed