

您正在接受 败血症治疗

当身体对某种感染做出极端反应,并开始损害自身组织和器官时,就会出现败血症。当您患有感染,就可能引发败血症。败血症是一种医疗紧急情况,需要立即接受救治。

败血症如何治疗?

败血症需要在医院接受治疗,越早开始治疗,效果越好。部分败血症患者需要在重症监护病房接受治疗。

治疗包括使用抗生素,以及在需要时使用:

- 其他药物
- 静脉输液
- 呼吸支持
- 手术治疗。

恢复和出院

出院前,医疗团队将与您详细沟通以下事项:

- 您的恢复过程以及预期时长
- 如何避免感染
- 如果您的病情没有好转或出现恶化,需要留意哪些症状
- 您的药物以及安全服用的方式
- 任何可能的长期影响及后续所需护理。

如果您曾患败血症,再次患病的风险会更高。如果您出院后担心症状正在恶化,请致电 **13Health** 寻求建议、前往家庭医生 (GP) 处就诊,或返回医院就诊。

长期影响

败血症的恢复需要时间,部分患者可能会出现持续的症状。在一段时间内,您可能仍会感觉身体不适,或者难以恢复正常活动。如果您感到担忧,请联系医生或医疗团队寻求帮助。

您的免疫系统在一段时间内可能较为脆弱,从而更容易发生感染。请按时接种疫苗,保持良好的卫生习惯,并向您的医疗团队咨询有助于恢复的治疗方法。

败血症治疗及恢复期间的支持服务

如果您需要口译员或文化联络员 (Cultural Liaison Officer) 的协助,请告知您的医疗团队。

请扫描下方二维码,或搜索“Sepsis Australia”,查找可在恢复期间为您及家人提供帮助的败血症支持团体。



如果您对本资料单有任何意见或建议,请扫描二维码反馈。



扫描二维码,获取更多关于败血症的信息和支持服务。