



### 1. 什么是对比灌肠?

对比灌肠是一种 X 光检查，用钡和肠道造影剂（Gastrografin®）之类的造影剂（以前叫做 X 光检查染料）来检查大肠（结肠）。

### 2. 会感觉不舒服吗？需要麻醉吗？

当肛管插入直肠以及气囊膨胀时，您可能会感到不舒服。在这个过程中可能会有鼓胀的感觉和轻微的腹部绞痛，这是正常的。有时候会使用让肌肉松弛的药物来缓解绞痛带来的不适。

这项检查不需要麻醉。

### 3. 准备检查

医疗影像部会告诉您如何准备检查。

- 会给您一个大肠检查准备资料包。肠道必须完全排清，以使检查准确、彻底。
- 如果您怀孕或怀疑可能怀孕，请告诉医护人员。

### 4. 在检查过程中

涂有润滑剂的小肛管将会轻轻插入直肠内一小段。肛管底部的小气囊将鼓起以帮助固定肛管并防止造影剂漏出。

造影剂将缓慢通过肛管注入大肠。有时会通过肛管向大肠加气。然后拍摄 X 光照片。

通过肛管将造影剂从大肠排出（尽可能排尽）。

肛管从直肠取出。

### 5. 检查后

检查结束后，您可以去上厕所。您的大便在今后几天可能会呈白色的，这是正常的。

检查结束后的几天内，要大量喝水，这是很重要的，以避免便秘和脱水。

### 6. 这个检查有什么危险？

与检查有关的危险和并发症包括但不限于以下几项。

#### 常见危险和并发症包括：

- 便秘。饮用大量液体及服用通便剂会有所帮助。
- 腹泻。会造成脱水，饮用大量液体会有所帮助。

#### 较不常见的危险和并发症包括：

- 可能会因为医疗和/或技术原因而无法进行检查。

#### 罕见危险和并发症包括：

- 因为暴露在 X 光下而增加患癌症的危险。
- 肠穿孔。这可能需要抗生素和手术。
- 肠出血。这可能需要其他医疗和/或矫正手术。
- 菌血症（血液感染）。这需要抗生素。
- 对造影剂有过敏反应。这可能会导致皮疹、荨麻疹、发痒、恶心、昏厥或者呼吸短促。可用药物缓解。
- 由于检查而导致死亡是 *非常* 罕见的。

### 7. 离开医院后有哪些安全问题？

如果感觉不舒服或有以下情况，请到最近的故事和急诊部门或看全科医生：

- 排便或排尿问题。
- 腹部压痛和/或腹硬。
- 严重持续性腹痛。
- 直肠出血（血液超过半杯）
- 发烧

#### 需要告诉医生/医护人员的事情：

.....  
.....  
.....



**Queensland  
Government**

**PATIENT INFORMATION SHEET ONLY**

**NO DOCUMENTED CONSENT REQUIRED**

*Unless patient is renal impaired*

If a documented consent is required  
Interpreter Services *must* be accessed